BOLLETTINO FITOSANITARIO NOCCIOLO (n°1 del 12/06/2026) Nepi

- Tempo di lettura:2 min di lettura

Programma di difesa Biologica e Integrata delle avversità del Nocciolo

Periodo di validità: 12 giugno – 19 giugno 2026

FITOPATOLOGIE

DIFESA INTEGRATA
Marciume bruno dei frutti: Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce
Necrosi grigia: Trichoderma asperellum, Trichoderma gamsii, Fosfonato di potassio**,** Boscalid (max 2 interventi per sost. Attiva) + Pyraclostrobin (max 2 interventi per sost. Attiva)
boscalid + pyraclostrobin
Necrosi batterica o avvizzimento: Bacillus subtilis, Prodotti rameici ammessi in agricoltura biologica (sotto la soglia consentita)

A seguito del monitoraggio finora effettuato sul territorio comunale, si riscontra diffusa presenza di patologie funginee a carico dell'apparato vegetativo per cui si consiglia di effettuare un trattamento con fungicida se non si è ancora fatto.

DIFESA BIOLOGICA
Cimici: olio di neem + saponi molli, estratti di piretro
Marciume bruno dei frutti: Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, Prodotti rameici ammessi in agricoltura biologica
Necrosi grigia: Trichoderma harzianum, Trichoderma gamsii, Prodotti rameici ammessi in agricoltura biologica
Necrosi batterica o avvizzimento: Bacillus amyloliquefaciens platarum, Prodotti rameici ammessi in agricoltura biologica

A seguito del monitoraggio finora effettuato sul territorio comunale, si riscontra diffusa presenza di patologie funginee a carico dell'apparato vegetativo per cui si consiglia di effettuare un trattamento con fungicida se non si è ancora fatto.

CIMICI
Per quanto concerne la presenza di cimici **NON si riscontra il raggiungimento della soglia di intervento che giustifichi un trattamento con prodotti convenzionali .** Si consiglia il monitoraggio a campione della vegetazione e attività di "frappage". Sono consigliati i saponi potassici molli in presenza di neanidi.

Fra i 18 e il 19 giugno da parte del Coordinamento Corilicolo Territoriale (CCT) della Regione Lazio saranno effettuati i primi lanci di Trissolcus japonicus detta "vespa samurai", antagonista naturale della cimice asiatica.

Si consiglia l'uso di trappola entomologica a cattura massale per la cimice asiatica
L'utilizzo di tale tipologia di trappole, da disporre nelle zone esterne e nelle capezzagne dei noccioleti, risulta direttamente efficace per la cattura delle cimici e indirettamente può migliorare

l’efficacia di eventuali trattamenti insetticidi, in quanto gli insetti attirati dalle trappole stesse permangono maggiormente nelle zone limitrofe .
Inoltre si consiglia, quando possibile, di procedere allo sfalcio degli inerbimenti in modo progressivo, lasciando sempre delle aree verdi dove gli insetti possono trovare rifugio, dove poi si può procedere allo sfalcio successivamente.

Indicazioni Generali

- Si prescrive di utilizzare i prodotti registrati sul nocciolo nei dosaggi indicati in etichetta, utilizzando **attrezzature per l’irrorazione in regola con le normative comunitarie**; tutte le operazioni devono essere effettuate da personale abilitato e lo smaltimento dei vuoti deve essere effettuato presso centri autorizzati per il trattamento dei rifiuti.
- Si ricorda che la soglia per l’uso dei prodotti rameici è di 28 Kg a ettaro di rame metallico in 7 anni, pari mediamente a 4 Kg/ha l’anno.
- Si richiamano gli agricoltori al rispetto delle norme previste dal **Regolamento Comunale** per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in particolare il rispetto delle **distanze** previste e la segnalazione sui confini con la **cartellonistica** prevista, necessaria a segnalare il trattamento, i principi attivi e le tempistiche da rispettare.
- Si ricorda che per un’adeguata riuscita i trattamenti devono essere **svolti la sera** dal calare del sole fino alle **primissime ore della mattina.**